

## 前言

淋巴瘤是淋巴組織發生腫瘤，可延淋巴系統蔓延至其他部位，包括胃、皮膚、眼窩、脾臟、鼻咽腔、甲狀腺等部位。目前對淋巴瘤的致病原因仍不清楚，但可能與免疫系統的缺失、感染、環境、藥物及遺傳等因子均有關。大體上可分為何杰金氏及非何杰金氏淋巴瘤，台灣地區以後者較常見。

## 常見症狀

- ◆ 頸部或其他部位淋巴結無痛性腫大。
- ◆ 發燒、夜間盜汗。
- ◆ 體重減輕、臉色蒼白、疲倦。
- ◆ 胃腸症狀、食慾不佳。
- ◆ 呼吸困難、咳嗽、胸痛。
- ◆ 不正常出血…。

## 診斷方法

- ◆ 淋巴結切片。
- ◆ 全身電腦斷層檢查。
- ◆ 骨髓檢查。

## 治療

- ◆ 初期：以局部放射線治療為主。
- ◆ 晚期：全身性或轉移性淋巴瘤，以化學治療為主

## 注意事項

- ◆ 維持正常的口腔黏膜。
- ◆ 維持足夠的營養。
- ◆ 避免病人受感染。
- ◆ 避免病人受傷。
- ◆ 注意病人的安全。
- ◆ 給予心理支持，使其接受心像改變的事實。

## 結論

淋巴瘤雖屬惡性病，但早期診斷與治療，必可獲得良好的治療效果。

諮詢電話：(02) 8966-7000 轉 4001

編印單位:護理部 10D Oncology-017  
編印日期:年月日第版  
修定日期:97年06月30日  
全院編碼:亞東醫院出版品 SH564  
材物編碼:  
宗旨: 持續提升醫療品質  
善盡社會醫療責任



護理指導資訊

## 淋巴瘤



亞東紀念醫院 祝您健康