



Irinotecan (Campto) 抗癌妥

一、適應症：轉移性大腸直腸癌

二、下列情況必須告訴醫生：

1. 曾有其他腸道方面疾病或有腸阻塞病史。
2. 過去使用 Campto 的療程中曾產生過敏反應。
3. 目前懷孕或哺喂母乳。
4. 是否有肝臟方面的疾病。
5. 是否有使用其他非醫師處方的藥物。

三、副作用及處理

副作用	護理措施
延遲性腹瀉 (通常發生在給藥後 24 小時之後)	您可以注意的是： 1、發現多次腹瀉情形時應立即告知醫護理人員 2、嚴重的腹瀉會造成電解質的流失，所以補充水分、電解質是有所幫助的。 3、採清淡流質食物，少量多餐。 4、避免刺激性食物(如茶、咖啡..等)。 5、避免食用高纖高渣食物(如水果、奶類製品...等)。
噁心、嘔吐	您可以注意的是： 1、不勉強進食，採「少量多餐、想吃才吃」的進食方法。 2、配合病患口味及喜好以促進食慾，不可生食，嚴重的嘔吐會造成電解質的流失，所以液體的補充是很重要的。 3、但在進餐前、中、後，勿攝取過多的水份以減少飽脹感及噁心感。 4、避免過甜及過冷、過熱之食物，減少噁心感。 5、在無特定限制下，食物以高蛋白、高熱量及各類食物均衡為原則，因為那對受損組織的修復及免疫力的恢復最有幫助。 6、進餐時請細嚼慢嚥，有足夠充份的時間進餐。 7、配合醫護理人員記錄輸出入量及量體重。
骨髓抑制	
白血球減少	您可以注意的是： 1、經常洗手、尤其是飯前及飯後。

	<ol style="list-style-type: none"> 2、自己及家人都要戴口罩，避免感染、發燒。 3、補充適當的營養，以達到足夠的抵抗力。 4、避免生食及未煮熟食物。 5、預防口腔潰瘍，保持口腔清潔。 6、盡量不要到公共場所，同時遠離感冒及其他疾病的人。 7、不要使用別人的牙刷或毛巾。 8、限制訪客。 9、勿接觸寵物或花卉。
紅血球減少	<p>您可以注意的是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、需經常抽血檢驗血球，必要時會輸血。 2、可能會覺得比較容易感覺疲倦或虛弱，注意下床活動安全，避免跌倒。 3、盡可能多休息 4、盡量攝取均衡的飲食。
血小板減少	<p>您可以注意的是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、需經常抽血檢驗血球，必要時會輸血。 2、避免擦撞到身體，容易瘀傷或出血。 3、注意適當的休息及營養。 4、使用軟毛牙刷或口腔棉棒清潔口腔，避免牙齦出血，若血小板$<25K/mm^3$則勿刷牙，用棉棒清潔口腔即可。 5、勿挖鼻孔，避免出血。 6、使用電動刮鬍刀，以免刮傷 7、由於阿斯匹靈會對血小板造成影響，應該避免使用此類藥品。
掉髮	<p>您可以注意的是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、掉髮為可逆性的，等治療告一段落會再長出來。 2、治療期間可先將頭髮作剪短的處理，以方便整理與清洗。 3、可選擇自己喜愛的髮型假髮。 4、也可購買漂亮的帽子或頭巾保護敏感的頭皮。避免陽光的傷害。
疲倦	<ol style="list-style-type: none"> 1、白天以小睡或者短暫休息來代替一段長時間的睡眠。 2、可能的話試著短距離的散步或輕度的運動，有助於減少疲憊。 3、攝取足夠營養，以補充體力。 4、提供病人安靜舒適的環境休息。

亞東紀念醫院 祝您健康

諮詢電話(02) 8966-7000 轉 4001或4002

編印單位:護理部 10D Oncology-025
編印日期:年月日第版
修定日期:97年06月30日
全院編碼:亞東醫院出版品 SH572
材物編碼:
宗旨:持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任