



Cisplatin (Cisplatinum/Platinex)：鉑帝爾

一、適應症：治療轉移性睪丸癌、卵巢癌、膀胱癌及頭頸部癌。

二、副作用及處理：

副作用	護理措施
神經毒性— 通常發生在最後一次劑量後的第二個月，停藥後4-7個月症狀會慢慢恢復。只要症狀有手指或腳趾麻木感或刺痛感，震動感及深部肌腱反射的降低或消失。	1 您可以注意的是： 1、此症狀是可逆性的。 2、避免暴露於寒冷或大風的環境下。 3、避免進食冰凍的食物或冷飲。 4、避免碰觸冷的東西或物體。 5、觀察肢體是否有感覺異常、運動無力等，若有請告知醫護人員。
噁心、嘔吐	您可以注意的是： 1、不勉強進食，採「少量多餐、想吃才吃」的進食方法。 2、配合病患口味及喜好以促進食慾，不可生食，嚴重的嘔吐會造成電解質的流失，所以液體的補充是很重要的。 3、但在進餐前、中、後，勿攝取過多的水份以減少飽脹感及噁心感。 4、避免過甜及過冷、過熱之食物，減少噁心感。 5、在無特定限制下，食物以高蛋白、高熱量及各類食物均衡為原則，因為那對受損組織的修復及免疫力的恢復最有幫助。 6、進餐時請細嚼慢嚥，有足夠充份的時間進餐。 7、配合醫護人員記錄輸出入量及量體重。
腎臟毒性： 急性腎臟衰竭可能會在給藥後1-3小時出現，給藥後24-48小時腎絲球過濾功能可能下降，但	您可以注意的是： 1、多攝取水份。 2、配合醫療按時記錄輸出入量及量體重。 3、給藥前後均需給予大量的水分。

<p>通常在治療完成後恢復正常。</p>	<p>4、注意小便量是否減少。 5、若肌氨酸酐 > 10 mg/dl，則須透過血液透析方式來處理。</p>
<p>耳毒性： 可能發生在治療後第四天，其特徵為耳鳴及聽力喪失。大多數的病人出現此毒性是不可逆的。</p>	<p>您可以注意的是： 注意病患的聽力反應，若有症狀發生，應通知醫師。</p>
<p>肌肉痛或關節痛： 多在劑量大於 135 mg/m²或延長注射時才會發生，多於注射後 2-3 天內發生，且持續 7 天，發生部位以大關節、背部、腳較多，但全身均會發生。</p>	<p>您可以注意的是： 1、是否有感覺異常、運動無力等。 2、治療期間多休息。 3、必要時，可給予止痛劑，如 Scanol、NSAID 等。</p>
<p>過敏反應： 出現臉部水腫、呼吸喘鳴聲、心跳加快、低血壓等症狀。</p>	<p>您可以注意的是： 1、身上是否有起紅疹？ 2、是否有發燒情形？ 3、是否發生呼吸急促或呼吸困難？ 上述情形請通知醫護人員！ 4、安排舒適臥位，讓病人得到舒適的休息</p>

亞東紀念醫院 祝您健康

諮詢電話(02) 8966-7000 轉 4001或4002

編印單位:護理部 10D Oncology-026
 編印日期:年月日第版
 修定日期:97年06月30日
 全院編碼:亞東醫院出版品 SH573
 材物編碼:
 宗旨: 持續提升醫療品質
 善盡社會醫療責任