

如何正確使用-氣喘吸入型緩解藥物

編印單位：小兒部
編印日期：107年05月17日第5版
全院編碼：亞東醫院出版品SH599
材物編碼：
宗旨：持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任
願景：成為民眾首選的醫學中心

1. 什麼是氣喘緩解藥物??

- ◎所謂的“吸入型氣喘緩解藥物”是指“短效或速效支氣管擴張劑”用於氣喘急性發作期。
- ◎什麼時候可以使用：呼吸喘、呼吸困難、胸悶、有喘鳴聲、咳嗽咳不停…等急性症狀產生時。
- ※常見的急救藥物有：



- ★備勞喘 (Berotec)
- ★泛得林 (ventolin)
- 撲咳喘(Bricanyl)
- ★一般年齡小於6歲或無法配合者，則需搭配“吸藥輔助器”使用
- ★全新或3天以上未使用，須對空排氣按壓2下，才可使用。



2. 使用吸入型氣喘緩解藥物須知：

- ◎每次可吸1~2口藥，若使用“吸入型氣喘緩解藥物”，20鐘後仍感不適可再使用1次；若症狀未改善或一個小時內有需要使用超過3次以上，則須送醫治療。
- ◎平時需使用“吸入型類固醇”或“欣流”做保養性的治療，不可只依賴“吸入型氣喘緩解藥物”。

如何正確使用-氣喘吸入型緩解藥物

編印單位：小兒部
編印日期：107年05月17日第5版
全院編碼：亞東醫院出版品SH599
材物編碼：
宗旨：持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任
願景：成為民眾首選的醫學中心

3. 什麼是氣喘緩解藥物??

- ◎所謂的“吸入型氣喘緩解藥物”是指“短效或速效支氣管擴張劑”用於氣喘急性發作期。
- ◎什麼時候可以使用：呼吸喘、呼吸困難、胸悶、有喘鳴聲、咳嗽咳不停…等急性症狀產生時。
- ※常見的急救藥物有：



- ★備勞喘(Berotec)
- ★泛得林 (ventolin)
- 撲咳喘(Bricanyl)
- ★一般年齡小於6歲或無法配合者，則需搭配“吸藥輔助器”使用
- ★全新或3天以上未使用，須對空排氣按壓2下，才可使用。



4. 使用吸入型氣喘緩解藥物須知：

- ◎每次可吸1~2口藥，若使用“吸入型氣喘緩解藥物”，20鐘後仍感不適可再使用1次；若症狀未改善或一個小時內有需要使用超過3次以上，則須送醫治療。
- ◎平時需使用“吸入型類固醇”或“欣流”做保養性的治療，不可只依賴“吸入型氣喘緩解藥物”。