

醫生要幫我安排打化療，是怎麼打？在哪裡打？

接受點滴注射化療，我有什麼施打方式可以選擇？

Q：除了可以住院打化療外，也可以在門診打化療嗎？

A：在北棟6樓就有門診化學治療中心，由主治醫師幫您安排預定的時間及治療椅/治療床位，即可在門診進行化療注射。

Q：門診化療有什麼優點？

A：可以確定治療日期，也方便彈性調整，避免因等待住院床位而延誤治療；家人不須因為要陪伴照護而請假；另外也降低住院時發生院內感染的機率。

Q：我的化療要打24小時或48小時，也可以在門診化療嗎？

A：可以的。可以使用攜帶式化療輸液器(俗稱化療奶瓶)進行化療，放入隨身小背包/腰包方便攜帶，待化療藥物輸注完畢後，照約定時間回到醫院，由護理人員移除攜帶式化療輸液器即可。



Q：化療奶瓶要插電嗎？

A：化療奶瓶是一種奶瓶狀的注射器，約一個可樂罐大小，在護理人員裝置妥當後，不需要電力、不受地心引力影響、不需自行做任何設定，即可自動輸注化療藥物。

Q：攜帶化療奶瓶回家後有什麼注意事項？

A：奶瓶請隨身攜帶，禁止注射部位行360度旋轉動作，另外如果注射部位出現紅腫痛等身體不適的狀況，請立即回到醫院就診。

Q：打化療會從哪裡/哪種管路打進身體？

A：施打化療可以從人工血管(port-A)、周邊置入中心靜脈導管(PICC)或周邊靜脈注射，由主治醫師向您建議並安排適合的管路進行注射。

Q：什麼是人工血管(port-A)？

A：外型有如小型聽診器一般，在皮膚外觀呈現只有約10元硬幣大小之圓形，醫師會將它裝在鎖骨的皮膚下，導管沿著大血管到達心臟附近，可用為長期且多次化療藥物注射，未拆線或傷口癒合前應保持清潔乾燥，術後約14天即可拆線，癒合後所見到的僅是一條線狀疤痕；如果未定期施打化療或點滴時，每2個月需要返回醫院沖洗管路。

Q：什麼是週邊置入中心靜脈導管（簡稱PICC）？

A：是一條柔軟有彈性的導管，一直通到心臟附近，可用為長期且多次化療藥物注射，置入後手臂上會有管路外露，以透明敷料覆蓋，需要每週返回醫院沖洗管路及進行換藥。

Q：什麼是周邊靜脈注射？

A：每次打化療時置入周邊靜脈之輸液管路，打完化療後移除。雖然減少了留置管路的照護麻煩，但如果需要長期多次接受靜脈注射化療藥物，血管可能變硬失去彈性，增加打針的困難；或藥物對淺層靜脈造成刺激、疼痛及靜脈炎；另外如果化療藥物從靜脈留置針滲出至皮下組織，可能會引起皮膚及組織刺激傷害甚至組織壞死。

關於【化療注射方式】		
歡迎使用手機掃描QR Code查詢更多資訊/觀看影片		
化療奶瓶注射器	Port-A自我照顧	PICC自我照顧
		

參考資料

- 一、亞東醫院腫瘤科暨血液科、化療室及10D病房自製衛教影片
- 二、亞東醫院護理部10D病房自製衛教單張

編印單位：腫瘤科暨血液科
編印日期：111 年 11 月 10 日 第一版
全院編碼：亞東醫院出版品

宗旨：持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任
願景：成為民眾首選的醫學中心